

Godkända växtskyddsmedel.



Svenska
Golf förbundet

20180518

PREPARAT REG NR KLASS VERKSAM SUBSTANS

GODKÄNDA HERBICIDER

Tomahawk 200 EC | 5236 | 2L | **Fluroxipyr - 1- metylheptylester 288 g/l**

Mot örtorgräs på golfbanor. Max 1 behandling per år. Maxdos 1,8 l/ha

TOTALBEKÄMPNINGSMEDEL

Roundup Bio | 3937 | 2L | **Glyfosat (isopropylaminsalt)**

Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Mot ogräs och annan vegetation: Max 1-3 behandlingar/år, maxdos vid varje behandling: 8 l/ha. Totala maximala dosen för inte överskrida 12 l produkt/ha och odlingssäsong

Roundup Max | 4466 | 2L | **Glyfosat (ammoniumsalt)**

Produktgodkännandet upphörde 2016-10-01. Produkten får överlåtas av innehavaren samt av andra t.o.m. 2017-03-31 och lagras, bortföras och användas t.o.m. 2018-03-31. Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Mot ogräs och annan vegetation: Max 1-3 behandlingar/år, maxdos vid varje behandling: 4 kg/ha

GODKÄNDA FUNGICIDER

Amistar | 4219 | 2L | **Azoxystrobin 250 g/l**

Verknings sätt: systemiskt. Off label registrering (utvidgat användningsområde), mer information i Greenbladet 2/2006

Amistar godkänt för användning på greener under följande villkor: Dos 1,0 liter/ha, högst 3 behandlingar per år

Medallion TL | 5075 | 2L | **Fludioxonil 125 g/l**

Verknings sätt: kontaktverkande. Rekommenderas vid marktemperaturer lägre än +6 grader C. Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 l/ha och tillfälle

Banner Maxx | 5074 | 2L | **Propikonazol 156 g/l**

Verknings sätt: systemiskt verkande även vid lägre temperaturer, rekommenderas vid marktemperaturer över +6 grader C
Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle

Headway | 5076 | 2L | **Propikonazol 104 g/l, Azoxystrobin 62,5 g/l**

Verknings sätt: systemiskt verkande, rekommenderas vid marktemperaturer över +10 grader C. Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle. Produktgodkännandet upphörde 2017/06/01. Produkten får ej lagras, bortskaffas och användas efter 2018/11/30

Headway | 5294 | 1L | **Propikonazol 104 g/l, Azoxystrobin 62,5 g/l**

Verknings sätt: systemiskt verkande, rekommenderas vid marktemperaturer över +10 grader C. Godkänt t.o.m 31/1/2019, max 2 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle. Villkor: Endast en behandling får göras under perioden 1/7 till 31/12

Heritage | 5361 | 2L | **Azoxystrobin 50 vikt %**

Verknings sätt: systemiskt Heritage är godkänt mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar.

Heritage är godkänt t.o.m 2022-12-31 under följande villkor: Maxdos 0,5 kg/ha, högst 2 behandlingar per år och minst 14 dagar mellan behandling

GODKÄNDA TILLVÄXTREGLERARE

Clippless | 5320 | 2L | **Trinexapak (etylester) 120g/l**

Anmärkning - För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett.

Primo Maxx | 5004 | 2L | **Trinexapak (etylester)**

För tillväxtreglering på golfbanor och andra idrottsanläggningar belagda med gräs. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett samt rekommendationer utifrån gjorda försök med produkten. Max 15 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn. Max dos vid varje behandling: 3,2 l/ha.

Totala maximala dosen får inte överskrida 16 l produkt/ha och säsong

GODKÄNDA BIOLOGISKA VÄXTSKYDDSMEDEL

Binab TFWP | 4420 | | **Trichoderma polysporum, T. atroviride**

Binab Golf respektive Binab Golf svampdödaren. Förebyggande. Får användas av alla och envar

behandlingsintervall 21-30 dagar, maxdos vid varje tillfälle: 0,6 kg/ha **Sprutråd:** Binab Golf: 0,6 kg/ha i 600 liter vatten. Eftervattna vid behov. Binab Golf Svampdödaren: 0,2 kg/0,1 ha i 200 liter vatten. Eftervattna vid behov. Produkten används under perioder och på ytor med högre risk för svampangrepp

Trianium-P | 5041 | | **Trichoderma harzianum stam T-22**

Behandling vid marktemperatur över +8 grader C. Behandling rekommenderas var 4:e vecka under sommar och höst. **Mer information:** Lindesro AB 042-161870, 070-545 10 53, www.lindesro.se Max 6 behandlingar/år, behandlingsintervall 28 dygn, maxdos per tillfälle: 0,45 g/m²

Mycostop | 4295 | | **Streptomyces griseoviridis stam K61**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label).

Mer information: Behandling vid temperatur över +15C. Ärligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 400 g/ha, max antal behandlingar 5 per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28.

Prestop | 4934 | | **Gliocladium catenulatum J1446**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor ((under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label).

Mer information: Behandling vid temperaturer mellan 5C och 15C. Ärligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 1 kg/ha, max antal behandlingar 5 per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28.

GODKÄNDA INSEKTICIDER

Merit Turf | 4803 | 2L | **Imidakloprid 0,5vikt%**

Mot larver av trädgårdsborrar och harkrankar på golfbanor. Efter spridning måste produkten vattnas ner med 5-10 mm vatten. Max 1 behandling/år. Maxdos/behandling 30 kg/ha. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda. Får inte användas där bin aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor under behandling. Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs.

"För mer information, se bekämpningsmedelsregistret hos kemikalieinspektionen; www.kemi.se "Vid all bekämpning gäller att vindanpassat skyddsavstånd skall bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruks spruta med bom"
Rekommenderad dos: se produktens etikett, vid blandning av preparat hänvisas till företagets rekommendationer.