

# Godkända växtskyddsmedel.

PREPARAT

REG NR

KLASS

VERKSAM SUBSTANS



Svenska  
Golf förbundet

20180816

## GODKÄNDA HERBICIDER

**Tomahawk 200 EC | 5236 | 2L | Fluroxipyr - 1-metylheptylester 288 g/l**

Mot örtogräs på golfbanor. Max 1 behandling per år. Maxdos 1,8 l/ha. Godkänt t.o.m 2022-12-31.

## TOTALBEKÄMPNINGSMEDEL

**Roundup Ultra | 3937 | 2L | Glyfosat (isopropylaminsalt)**

Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Mot ogräs och annan vegetation: Godkänt t.o.m 2018-12-31. Max 1-3 behandlingar/år, maxdos vid varje behandling: 4 l/ha. Totala maximala dosen för inte överskrida 12 l produkt/ha och odlingssäsong

**Roundup Max | 4466 | 2L | Glyfosat (ammoniumsalt)**

**OBS: har utgått och får inte längre användas eller lagras!** Produktgodkännandet upphörde 2016-10-01. Produkten fick överlåtas av innehavaren samt av andra t.o.m. 2017-03-31 och lagras, bortföras och användas t.o.m. 2018-03-31.

## GODKÄNDA FUNGICIDER

**Amistar | 4219 | 2L | Azoxystrobin 250 g/l**

**Verknings sätt:** Systemiskt. Off label registrering (utvidgat användningsområde), mer information i Greenbladet 2/2006. Godkänt t.o.m 2018-09-30 för användning på greener under följande villkor: Dos 1,0 liter/ha, högst 3 behandlingar per år.

**Medallion TL | 5075 | 2L | Fludioxonil 125 g/l**

**Verknings sätt:** Kontaktverkande. Rekommenderas vid marktemperaturer lägre än +6 grader C. Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 l/ha och tillfälle

**Banner Maxx | 5074 | 2L | Propikonazol 156 g/l**

**Verknings sätt:** Systemiskt verkande även vid lägre temperaturer, rekommenderas vid marktemperaturer över +6 grader C. Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle

**Banner Maxx II | 5440 | 2L | Propikonazol 162 g/l**

**Verknings sätt:** Systemiskt verkande, mot svampangrepp på golfbanor, rekommenderas vid marktemperaturer över +10 grader C. Godkänt t.o.m 2020-01-31. Max 2 behandlingar/år på green och tee, behandlingsintervall minst 21 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle. Max 1 behandling vartannat år på fairway.

**Headway | 5076 | 2L | Propikonazol 104 g/l, Azoxystrobin 62,5 g/l**

**Verknings sätt:** Systemiskt verkande, rekommenderas vid marktemperaturer över +10 grader C. Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle. Produktgodkännandet upphörde 2017-06-01. Produkten får ej lagras, bortskaffas och användas efter 2018-11-30

**Headway | 5294 | 1L | Propikonazol 104 g/l, Azoxystrobin 62,5 g/l**

**Verknings sätt:** Systemiskt verkande, rekommenderas vid marktemperaturer över +10 grader C. Max 2 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 liter/ha och tillfälle. Produktgodkännandet upphörde 2018-03-01. Produkten får ej lagras, bortskaffas och användas efter 2019-08-31

**Instrata Elite | 5466 | 2L | Difenconazol 80 g/l; fludioxonil 80g/l**

**Verknings sätt:** Kontakt och systematiskt. Mot svampangrepp på greener och tees. 1 behandling per säsong, maxdos 3 l/ha. Godkänt t.o.m 2019-10-31

**Exteris Stressgard | 5461 | 2L | Fluopyram 12,5 g/l; trifloxystrobin 12,5 g/l**

**Verknings sätt:** Systemiskt. Mot snömögel på tee, green och krage. Max 2 behandlingar, > 14 dagar mellan behandling, max dos 10 l/ha. Godkänt t.o.m 2019-07-01

**Heritage | 5361 | 2L | Azoxystrobin 50 vikt %**

**Verknings sätt:** Systemiskt. Heritage är godkänt mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar. Heritage är godkänt t.o.m 2022-12-31 under följande villkor: Maxdos 0,5 kg/ha, högst 2 behandlingar per år och minst 14 dagar mellan behandling

## GODKÄNDA TILLVÄXTREGLERARE

**Clippless NT | 5320 | 2L | Trinexapak (etylester) 120g/l**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett. Godkänt t.o.m 2019-04-30. Får användas mellan 1 mars - 30 nov, max 40 appliceringar/år, max intervall 7 dagar, max dos 0,4 l/ha, totalt max 16 per säsong.

**Primo Maxx | 5004 | 2L | Trinexapak (etylester) 121g/l**

För tillväxtreglering på golfbanor och andra idrottsanläggningar belagda med gräs. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett samt rekommendationer utifrån gjorda försök med produkten. Max 15 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn. Max dos vid varje behandling: 3,2 l/ha, totalt max 16 l/ha per säsong

**Primo Maxx II | 5410 | 2L | Trinexapak (etylester) 116g/l**

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Rekommenderad dos och frekvens för green. För tee, fairway och semi ruff se etikett. Godkänt t.o.m 2019-04-30. Får användas mellan 1 mars - 30 nov, max 40 appliceringar/år, max intervall 7 dagar, max dos 0,4 l/ha, totalt max 16 l/ha per säsong.

## GODKÄNDA BIOLOGISKA VÄXTSKYDDSMEDEL

**Binab TF WP | 4420 | | Trichoderma polysporum, T. atroviride**

Binab Golf respektive Binab Golf svampdödaren. Förebyggande. Produkten används under perioder och på ytor med högre risk för svampangrepp behandlingsintervall 21-30 dagar, maxdos vid varje tillfälle: 0,6 kg/ha **Sprutråd:** Binab Golf: 0,6 kg/ha i 600 liter vatten. Eftervattna vid behov. Binab Golf Svampdödaren: 0,2 kg/0,1 ha i 200 liter vatten. Eftervattna vid behov.

**Trianum-P | 5041 | | Trichoderma harzianum stam T-22**

Behandling vid marktemperatur över +8 grader C. Behandling rekommenderas var 4:e vecka under sommar och höst. **Mer information:** Lindesro AB 042-161870, 070-545 10 53, www.lindesro.se. Max 6 behandlingar/år, behandlingsintervall 28 dygn, maxdos per tillfälle: 0,45 g/m<sup>2</sup>

**Mycostop | 4295 | | Streptomyces griseoviridis stam K61**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label). **Mer information:** Behandling vid temperatur över +15°C. Årligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 400 g/ha, max antal behandlingar 5 per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28.

**Prestop | 4934 | | Gliocladium catenulatum J1446**

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label). **Mer information:** Behandling vid temperaturer mellan 5°C och 15°C. Årligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 1 kg/ha, max antal behandlingar 5 per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28.

## GODKÄNDA INSEKTICIDER

**Merit Turf | 4803 | 2L | Imidakloprid 0,5vikt%**

Mot larver av trädgårdsborrar och harkrankar på golfbanor. Efter spridning måste produkten vattnas ner med 5-10 mm vatten. Max 1 behandling/år. Maxdos/behandling 30 kg/ha. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda. Får inte användas där bin aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bukpor under behandling. Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs.

**Merit Turf | 5366 | 2L | Imidakloprid 0,5vikt%**

Mot larver av trädgårdsborrar och harkrankar på golfbanor (Green, Tee, Fairway). Får användas Mars till juli. Efter spridning måste produkten vattnas ner med 5-10 mm vatten. Maxdos/behandling 30 kg/ha. Godkänd t.o.m 2023-07-31. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda. Får inte användas där bin aktivt söker efter föda.

"För mer information, se bekämpningsmedelsregistret hos kemikalieinspektionen, www.kemi.se. Vid all bekämpning gäller att vindanpassat skyddsavstånd skall bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukspruta med bom". Rekommenderad dos: se produktens etikett, vid bländning av preparat hänvisas till företagets rekommendationer.